



Анатомия и возрастная физиология.oi(dor_дСПО)

- 1 Основной функцией дендритов является ...
- 2 Основной функцией аксонов является ...
- 3 Структурное образование, обеспечивающее передачу импульса возбуждения с одной клетки на другую, – это ...
- 4 Сагиттальные плоскости делят тело человека на ... части
- 5 Говоря о значении нервной системы, можно утверждать, что она ... (укажите 2 варианта ответа)
- 6 Структурно-функциональной единицей нервной ткани является ...
- 7 На окончании чувствительных нейронов ...
- 8 Синаптические пузырьки ... строение
- 9 Синаптическая щель заполнена ...
- 10 Нейрон или нервная клетка – структурно-функциональная единица нервной системы. Нейрон предназначен для приема извне, обработки, хранения, передачи и вывода вонне информации с помощью электрических и химических сигналов. Один из видов нейронов образует нервные пути и проводит информацию от центральной нервной системы к мышцам, а также отвечает за образование пирамидных путей. Определите, о каком виде нейронов идет речь?
- 11 Полушария большого мозга впервые появились у ...
- 12 Нервная ткань развивается из ...
- 13 Закон исторического развития, т. е. филогенеза, был сформулирован ...
- 14 К. Бэр и Э.Геккель установили, что ...
- 15 ... – это процесс исторического развития живой природы, отдельных групп организмов или органов и систем





- 16 Гидра, если прикоснуться к ней иголкой, ...
- 17 ... – это индивидуальное развитие животного
- 18 В постнатальном периоде выделяют ...
- 19 Ганглиозная пластинка располагается ... нервной трубки
- 20 А. Н. Леонтьев выделяет ... стадий в эволюционном развитии психики
- 21 Врач-невролог проверил у пациента сухожильный коленный рефлекс путем постукивания молоточком по связке надколенника. Назовите место расположение тела чувствительного нейрона.
- 22 Типичное место для проведения люмбальной пункции находится на уровне позвонков ...
- 23 Нижняя граница спинного мозга у взрослого человека соответствует уровню поясничных позвонков ...
- 24 Тонкий и клиновидный пучки спинного мозга расположены в ... канатике
- 25 В мозжечке выделяют ...
- 26 Спинной мозг ...
- 27 Спинной мозг человека состоит из ...
- 28 К спинному мозгу возбуждение проходит по ...
- 29 Чувствительные нейроны находятся в ...
- 30 От спинного мозга отходит ... нервов
- 31 Ганглиями называют ...
- 32 В ... отделах спинного мозга наблюдается утолщение
- 33 Пациент получил травму спинного мозга в автомобильной аварии и потерял чувствительность. Какие структуры скорее всего были поражены?





- 34) К врачу обратилась женщина 40 лет с жалобами на резкий подъем температуры до 40°C, тошноту, рвоту, головную боль, общую слабость. При осмотре выявлено затруднение при повороте головы и шеи, повышенная чувствительность к свету, звуку, прикосновениям, головокружение, специфические менингеальные симптомы. Предположительный диагноз – менингит. Для уточнения решено выполнить спинномозговую пункцию. На уровне какого позвонка у взрослого человека мозговой конус переходит в терминальную нить (заканчивается спинной мозг)?
- 35) Изолирующую и трофическую функцию в миелинизированном волокне ...
- 36) Нейронную доктрину сформулировал ...
- 37) Особенность плазматической мембраны – ...
- 38) Белок, из которого состоят нейротрубочки, – это ...
- 39) Белок, из которого состоят микрофиламенты, – это ...
- 40) В аксоплазме ...
- 41) Нет миелина на миелиновых волокнах ...
- 42) Нейроны чувствительных и симпатических ганглиев покрывают ...
- 43) Миелин состоит из ...
- 44) По форме астроциты представляют собой ... клетки
- 45) Аксон
- 46) Нейрон
- 47) Дендрит

