



Анатомия центральной нервной системы.

- 1 ... черепно-мозговой нерв содержит двигательные, парасимпатические и чувствительные волокна, а также симпатические в малом количестве
- 2 Барабанная полость находится ... ухе
- 3 Рецепторами поперечно-полосатой мышечной ткани являются ...
- 4 Важнейшим принципом функционирования ретикулярной формации, обеспечивающим ее надежность, является то, что ...
- 5 Корковый конец зрительного анализатора представлен клетками коры ...
- 6 Метаталамус представлен ...
- 7 ... черепно-мозговой нерв является двигательным, его ядро находится в среднем мозге, из мозга выходит из верхнебокового края моста, из черепа выходит через верхнюю глазничную щель, иннервирует верхнюю косую мышцу глаза
- 8 Сильвиев водопровод – это узкий канал, который соединяет ... желудочки
- 9 От надключичной части плечевого сплетения спинномозговых нервов отходят ... ветви
- 10 В боковом канатике к промежуточному мозгу восходит ... путь, который доставляет температурно-болевое чувство (первичную боль)
- 11 Установлено, что тельца Фатер-Пачини являются рецепторами ...
- 12 Вентральная часть (высший вегетативный центр) промежуточного мозга называется ...
- 13 Двигательные нейроны черепно-мозгового нерва лежат в двигательном ядре ... нерва в среднем мозге
- 14 На поперечном разрезе среднего мозга выделяют ... и ножку мозга
- 15 Конъюнктивa – это ...
- 16 ... нерв входит в мозг через хиазму (неполный перекрест)





- 17) Передний корешок спинного мозга состоит из отростков двигательных нейронов, тела которых лежат ...
- 18) Средний мозг (mesencephalon) развивается в процессе филогенеза под преимущественным влиянием ... анализатора
- 19) Колбочки сетчатки глаза воспринимают ...
- 20) Кора полушарий большого мозга имеет слои: ...
- 21) В ... выделяют непарную срединную часть (филогенетически старую часть) – червь
- 22) На некотором расстоянии от спинного мозга двигательный корешок прилегает к чувствительному, образуя ...
- 23) Границей между вентральной и дорзальной частями моста служит толстый слой поперечных волокон, называемый ...
- 24) К гипоталамусу относят ...
- 25) Полость заднего мозга представляет собой ...
- 26) Сетчатка состоит из ... слоев
- 27) Серое вещество мозжечка расположено в виде ...
- 28) Мост краниально граничит ...
- 29) В межпозвонковых отверстиях вблизи соединения обоих корешков задний имеет утолщение – спинномозговой узел, содержащий ...
- 30) Палочки и колбочки расположены в ... слое сетчатки
- 31) ... черепно-мозговой нерв содержит двигательные, парасимпатические и чувствительные волокна, а также симпатические в малом количестве
- 32) Барабанная полость находится ... ухе
- 33) Рецепторами поперечно-полосатой мышечной ткани являются ...
- 34) Важнейшим принципом функционирования ретикулярной формации, обеспечивающим ее надежность, является то, что ...
- 35) Коровый конец зрительного анализатора представлен клетками коры ...





- 36) Метаталамус представлен ...
- 37) ... черепно-мозговой нерв является двигательным, его ядро находится в среднем мозге, из мозга выходит из верхнебокового края моста, из черепа выходит через верхнюю глазничную щель, иннервирует верхнюю косую мышцу глаза
- 38) Сильвиев водопровод – это узкий канал, который соединяет ... желудочки
- 39) От надключичной части плечевого сплетения спинномозговых нервов отходят ... ветви
- 40) В боковом канатике к промежуточному мозгу восходит ... путь, который доставляет температурно-болевое чувство (первичную боль)
- 41) Установлено, что тельца Фатер-Пачини являются рецепторами ...
- 42) Вентральная часть (высший вегетативный центр) промежуточного мозга называется ...
- 43) Двигательные нейроны черепно-мозгового нерва лежат в двигательном ядре ... нерва в среднем мозге
- 44) На поперечном разрезе среднего мозга выделяют ... и ножку мозга
- 45) Конъюнктивит – это ...
- 46) ... нерв входит в мозг через хиазму (неполный перекрест)
- 47) Передний корешок спинного мозга состоит из отростков двигательных нейронов, тела которых лежат ...
- 48) Средний мозг (mesencephalon) развивается в процессе филогенеза под преимущественным влиянием ... анализатора
- 49) Колбочки сетчатки глаза воспринимают ...
- 50) Кора полушарий большого мозга имеет слои: ...
- 51) В ... выделяют непарную срединную часть (филогенетически старую часть) – червь
- 52) На некотором расстоянии от спинного мозга двигательный корешок прилегает к чувствительному, образуя ...





- 53 Границей между вентральной и дорзальной частями моста служит толстый слой поперечных волокон, называемый ...
- 54 К гипоталамусу относят ...
- 55 Полость заднего мозга представляет собой ...
- 56 Сетчатка состоит из ... слоев
- 57 Серое вещество мозжечка расположено в виде ...
- 58 Мост краниально граничит ...
- 59 В межпозвонковых отверстиях вблизи соединения обоих корешков задний имеет утолщение – спинномозговой узел, содержащий ...
- 60 Палочки и колбочки расположены в ... слое сетчатки

