



## Психологическое сопровождение в экстремальных условиях жизни и деятельности.

- 1 Психология экстремальных ситуаций составляет раздел ... психологии
- 2 Кризисная психология сформировалась в конце ...
- 3 Экстренная психологическая помощь населению должна основываться на принципе интервенции в поверхностные слои сознания, то есть на работе с ...
- 4 «... терапия» реализуется через систему звукоусилителей и состоит из трансляции специальных рекомендаций, которые должны услышать пострадавшие
- 5 В соответствии с работами Национального института психического здоровья (США), психические реакции при катастрофах подразделяются на фазы героизма, «медового месяца», ...
- 6 В соответствии с работами Национального института психического здоровья (США) по изучению фаз психических реакций ложные предположения о возможности преодолеть случившееся возникают на фазе ...
- 7 В соответствии с работами Национального института психического здоровья (США) фаза «медового месяца» наступает после катастрофы и длится ...
- 8 Согласно классификации последовательности фаз или стадий в динамике состояния людей после психотравмирующих ситуаций, предложенной М.М. Решетниковым, стадия «психологическая демобилизация» длится ...
- 9 Согласно классификации последовательности фаз или стадий в динамике состояния людей после психотравмирующих ситуаций, предложенной М.М. Решетниковым, «стадия разрешения» проявляется через ... после стихийного бедствия
- 10 Ложные представления или умозаключения, в ошибочности которых пострадавшего невозможно разубедить, относятся к основным признакам ...
- 11 В состоянии апатии человек может находиться ...
- 12 К основным признакам апатии следует отнести ...

Самый быстрый способ связи — мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max

Help@disynergy.ru | +7 (924) 305-23-08



- (13) Ступор может длиться ...
- (14) При первой помощи пострадавшему в состоянии ступора следует ...
- (15) В случае проявления у пострадавшего неконтролируемой нервной дрожки рекомендуется ...
- (16) Неверно, что к основным группам симптомов посттравматической патологии следует отнести ...
- (17) Психические проявления общего адаптационного синдрома обозначаются как «...»
- (18) ... – это непсихотическая отсроченная реакция на травматический стресс, способный вызвать психические нарушения
- (19) К основным подвидам посттравматических стрессовых расстройств относятся острое, хроническое и ...
- (20) Острое посттравматическое стрессовое расстройство длится ...
- (21) К стойким симптомам повышения психологической чувствительности или возбудимости (не наблюдавшимся до действия стрессора) следует отнести ...
- (22) Согласно международной классификации психических нарушений в травматическом стрессе, к основным группам симптомов относятся симптом повторного переживания (или симптом «вторжения»), симптом избегания и ...
- (23) Согласно критериям посттравматического стрессового расстройства по Диагностическому и статистическому руководству по психическим расстройствам IV издания (DSM-IV) постоянные симптомы возрастающего возбуждения, не наблюдавшиеся до травмы, определяются по наличию ...
- (24) Неверно, что к основным типам посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) относится ... тип
- (25) Дисфорический тип посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) характеризуется ...
- (26) При диагностике посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) первостепенную роль играет ...
- (27) ... ситуации – это такие экстремальные критические события, которые обладают мощным негативным воздействием, ситуации угрозы, требующие от индивида экстраординарных усилий по совладанию с последствиями воздействия



- (28) К структурированному клиническому диагностическому интервью (СКИД) для клинической диагностики уровня выраженности симптоматики посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и частоты проявления симптомов дополнительно применяется ...
- (29) Для оценки степени выраженности посттравматических стрессовых реакций у ветеранов боевых действий была разработана ...
- (30) ... – одна из крайних позиций психотерапевта, связанная с фантазиями спасения или мести и обусловленная «избыtkом» эмпатии
- (31) Понятие «вторичная травма», или «вторичный травматический стресс», применяется относительно к ...
- (32) Вторичный травматический стресс, как правило, сопровождается ...