



## Психологическое сопровождение после заболеваний и травм.

- 1 Неверно, что формированию субъективного отношения к болезни способствует ... параметр
- 2 Реализация индивидуальной программы и групповых занятий является частью ... этапа психологического сопровождения
- 3 Всестороннее уважение к члену семьи, проходящему реабилитацию, и к каждому члену семьи, формирование позитивной «Я-концепции» реализуется благодаря ...
- 4 Неверно, что социально-психологические факторы в развитии заболеваний выполняют ... функцию
- 5 ... – это закрепленная организация отдельных психосоматических компонентов, представляющая собой жесткую функциональную систему реагирования на средовые воздействия
- 6 Неверно, что одним из основных вариантов психосоматической дезадаптации пациентов с заболеваниями внутренних органов является ... вариант
- 7 При взаимодействии с пациентом, больным онкологическим заболеванием, врач ...
- 8 Тревога, страх, депрессия или желание смерти возникают на ... личностного реагирования на онкологическое заболевание
- 9 Пациенты, отличающиеся эмоциональной открытостью и жизнерадостностью, легче адаптирующиеся к травмирующей ситуации, – это ...
- 10 Пациенты шизоидного типа ...
- 11 Истерические расстройства беременных женщин чаще наблюдаются в ... триместрах беременности
- 12 Неверно, что послеродовые психозы чаще всего встречаются у ...
- 13 Фактором повышенного риска возникновения пограничных психических расстройств является ...
- 14 Неверно, что к наиболее эффективным психотерапевтическим методикам относится ...





- (15) К группе больных с затяжным течением, частыми обострениями и декомпенсациями психопатологических расстройств относятся ... от числа диспансерной группы больных
- (16) Больные с непсихотической резидуальной органической патологией составляют ... диспансерных больных
- (17) Программа, в основе которой лежит физиологический стрессор, вызывающий комплекс соматопсихических реакций защитно-адаптационного характера, – это ... программа
- (18) ... программа направлена на осознание как внутриличностных проблем, так и на нахождение путей решения напряженных межличностных взаимодействий
- (19) Программа аутотренинга направлена на ...
- (20) Впервые случаи алкогольных психозов у подростков стали регистрироваться в ...
- (21) В спектре потребляемых наркотических средств процент тяжелых наркотиков, вводимых подростками внутривенно, составляет ...
- (22) Общепринято, что здоровье человека зависит на ... от уровня организации медицинской помощи
- (23) Работа с физическими и эмоциональными последствиями употребления наркотиков и алкоголя (нарушение сна, агрессивность, депрессия) проводится на ... этапе реабилитации пациентов
- (24) Индивидуальная работа с психологом составляет ... программы комплексной психофизиологической реабилитации наркозависимых и членов их семей
- (25) Неверно, что критерием отбора в группу лечения наркозависимых является ...
- (26) При употреблении ... наблюдается нарушение внимания, появление рассеянности, замедление скорости реакции
- (27) Потребление ... вызывает расстройство сна и снижение аппетита, появление беспокойства, приступов депрессии, раздражительности